

Schlumbergera truncatus

A.K.A. *Zygocactus truncatus*

- Nombre común o vulgar: Cactus de acción de gracias, Cactus de Navidad, Cactus de pascua, Cacto de Navidad, Santa Teresita.

Se trata de un cactus que florece espectacularmente durante el invierno. Hay diferentes colores de flor según la variedad.

Es originario de zonas tropicales de Brasil. Como sabes, la mayoría de las cactáceas provienen de lugares secos, pero estos cactus prosperan en las selvas húmedas, anclados sobre los propios árboles (plantas epifitas).

Primera consecuencia que sacamos de conocer su origen tropical: viven a la sombra, gustan de humedad y, al contrario de los cactus del desierto, no tienen que guardar un periodo de reposo en invierno.



LUZ

El Cactus de Navidad puede florecer año tras año sin recibir nada de sol directo (recuerda que vive bajo los árboles en Brasil), pero es más conveniente que disfrute de una buena iluminación esté donde esté puesto.

En la terraza puede darle un poco el sol, pero no excesivo. Aguanta el sol débil del invierno pero no el del verano.

En verano, es bueno sacarlo fuera, a la sombra. No es obligatorio esto de sacarlo, porque tolera estar en el interior de la casa todo el año.



TEMPERATURA

Si lo tienes en una terraza, cuidado con las heladas; resguarda dentro sin riesgo.

HUMEDAD AMBIENTAL

Agradece la pulverización con agua, el aire húmedo. En los días más calurosos puedes rociar el follaje.

RIEGO

Es un cactus tropical y se riega más que los cactus "normales". Sin embargo, cuidado con el posible exceso que se acumule en la maceta.



Cuando se acerque el invierno, cuelga la planta en una habitación fresca y con luz y no la lles al calor hasta que aparezcan los brotes de las flores. Practica un riego somero incluso durante la floración.

Regar más o menos dependerá de varias cosas, por ejemplo, el tipo de sustrato, si lo tienes en el exterior, si la maceta es más o menos grande y si recibe sol o no.

Si se le ponen las puntas lacias, lo más probable es que sea por exceso de riego, en lugar de falta de agua como piensa mucha gente.

Si se le ponen las puntas lacias, lo más probable es que sea por exceso de riego, en lugar de falta de agua como piensa mucha gente. Como riegues más será peor, aparecerá podredumbre en la base y deberás sanear la planta cortando todo lo afectado. Luego puede rebrotar.

Como mínimo 1 riego por semana y como media, 2 riegos semanales. A poder ser, con agua no calcárea.

ABONO

Aplica de forma regular un fertilizante rico en fósforo y potasio para favorecer la floración.

Si lo ves un poco decaído, haz un riego con abono añadiendo también un poco de quelatos de hierro (un abono especial rico en hierro); recuperará vigor.

CAMBIO DE MACETA

Debido a su lento crecimiento, no es necesario un cambio de maceta anual, sólo cuando se haga grande. Hazlo en primavera. Usa un sustrato muy poroso para que drene bien y que las raíces estén aireadas.

PROBLEMAS

- Evita los encharcamientos que producen hongos y pudrición de la base de los tallos. Si la planta estuviera muy afectada, elimina las partes dañadas y trasplanta el resto como si fueran esquejes.
- Las plantas alimentadas en exceso florecerán muy poco o nada.
- Cuando estén los brotes en crecimiento, no gires la planta, crece hacia la luz y se caen si de repente tienen que desarrollarse en una dirección diferente.
- Si las flores caen sin llegar a abrirse puede ser por corrientes de aire o por falta de agua. Sitúala alejada de las corrientes o no dejes que el compost se seque entre riegos.
- Pérdida de color en los tallos: falta de luz. Busca un lugar luminoso para su ubicación.
- Cochinilla algodonosa

Le suele atacar en verano, con el calor, la cochinilla algodonosa. Mira de vez en cuando a ver si tiene. Se eliminan limpiando los tallos con un algodón empapado en alcohol metílico.

- Pulgones

Si su número no es elevado, elimínalos pulverizando con agua jabonosa y aclarando después la superficie



MULTIPLICACIÓN

Para obtener nuevas plantas, corta segmentos de tallo, deja secar la zona del corte 24 horas y clávalos en posición vertical en un sustrato ligeramente húmedo. La época ideal es mayo-junio, pero también se puede hacer durante todo el verano.

Resumen:

- Origen: Brasil, montañas de Río de Janeiro.
- Cactus epífitos.
- Vive sobre las ramas de los árboles de zonas boscosas o entre rocas de las laderas y barrancadas en zonas con colinas escarpadas.
- Estos cactus de porte colgante ofrecen una floración abundante en invierno.
- Las flores miden 6-8 cm de longitud y su color es rosa o rojo oscuro.
- Ramas formadas por segmentos (artejos) de bordes dentados.
- Longevidad: de 15 a 20 años.
- Luz: sombra, pero con mucha claridad. Nunca debe exponerse a la luz directa del sol.
- La floración puede ser inducida mediante tratamiento de "días cortos".
- Una norma de probado éxito es la que consiste en proporcionar 3-10 horas de luz al día a una temperatura de 17-20° C durante 6-8 semanas a partir de mediados o final de septiembre (en el hemisferio norte), que es cuando la planta emite nuevos tallos.
- Temperaturas: no bajar de 10°C y máximo 25°C.
- En cuanto se formen las yemas, no mueva a la planta y mantenga una temperatura regular.
- Según Haage, temperaturas superiores a 23°C o inferiores a 12°C en el período de formación de los botones florales dificultan la aparición de éstos.
- Debería ser cultivado al aire libre en un lugar sombreado hasta otoño, y meterlo en invernaderos, con ventilación cuando los capullos se están formando.
- Humedad ambiental: procurarle cierta humedad en el ambiente y un lugar fresco. Mínima del 40%.
- Vaporice de vez en cuando durante el invierno (con más de 16°C).
- Debe tenerse en cuenta que el traslado de las plantas con flores en formación desde un lugar con cierta humedad relativa a otro en donde haya sequedad en el ambiente puede causar la caída de los botones florales.
- Sustrato: viven sobre materia orgánica en las axilas de los árboles. Sustrato humífero, un buen drenaje para lo que será importante que esté compuesta de arena y turba.
- Sustrato para orquídeas, mezclado al 50% con mantillo de hojas.
- Requiere sustrato con mayor porcentaje de materia orgánica, añadiendo un 30% de turba fertilizada o mantillo de hojas.
- Riego: riego cada 3 ó 5 días, en verano y durante la floración; en otoño, cada 15 días.
- Dejar secar el sustrato antes de volver a aplicarle agua.
- Abono: en verano hasta principios de otoño, añadir al menos una vez al mes un abono líquido para cactáceas.
- Plagas: cochinillas.
- Trasplante: cambio de maceta en primavera, cada tres o cuatro años.

- Multiplicación: esqueje, injerto o semilla.
- Téngase en cuenta su autoesterilidad.
- El medio más generalizado es el de enraizamiento de segmentos endurecidos que tengan brotes en crecimiento.
- El mejor momento es a finales de primavera (mayo-junio en el Hemisferio Norte), logrando así que florezcan en el invierno siguiente.
- Puede injertarse sobre alguna especie de Peireskia, sobre Hylocereus undatus, o algún otro Hylocereus, así como algunos Cereus, Selecinerus macdonaldiae, Selecinerus knuthianus, Selenicereus pteranthus, Selenicereus humatus, etc.

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Cactaceae
Subfamilia: Cactoideae
Tribu: Rhipsalideae
Género: Schlumbergera